

OLYMPIADES ACADEMIQUES DE MATHEMATIQUES

ACADEMIE d'AMIENS


SESSION 2006

Sujet pour les élèves de 1 S

Exercice 1 : la « spirale »

Le plan, muni d'un repère orthonormal d'origine O (unité 1 cm), est quadrillé par les droites parallèles aux axes de coordonnées et passant par tous les points à coordonnées entières du plan. Sur ce quadrillage on construit, en partant du point O vers le bas, une ligne brisée en forme de « spirale » qui « tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre », conformément au dessin ci-dessous.

Pour tout point M à coordonnées entières, on note $l(M)$ la longueur de la portion de « spirale » qui va du point O jusqu'au point M.



- 1) Soit A un point de l'axe des abscisses tel que $OA=5$. Déterminer les valeurs possibles de $l(A)$.
- 2) Soit B le point de coordonnées (2005 ; 2006). Déterminer $l(B)$.
- 3) Déterminer les coordonnées du point C tel que $l(C)=2006$.
- 4) La « spirale » passe-t-elle effectivement par tous les points à coordonnées entières du plan ?


On rappelle le résultat suivant : Pour tout entier naturel n non nul, $1+2+3+\dots+n = \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$

Exercice 2 : Les cylindres de papier

1. On prend une feuille de papier de 21 cm de large et 29,7 cm de long (le format A4). On forme un cylindre en roulant la feuille de papier et en faisant coïncider deux bords opposés. En faisant de même avec les deux autres bords opposés, on obtient un autre cylindre.

Les deux cylindres ont-ils même volume ?

2. Dans une feuille de papier de format A4, on enlève deux triangles de mêmes dimensions selon la figure ci-dessous :



Si on roule la feuille restante bord à bord, on obtient un premier cylindre (n°1). Si on la roule en faisant coïncider les autres bords opposés, on obtient un second cylindre (n°2).

Trouver la ou les valeurs de x (en cm) pour que les deux cylindres ainsi obtenus aient le même volume.

Exercice 3

ABCD est un quadrilatère convexe quelconque.

I, J, K et L sont les milieux respectifs des côtés [AB], [BC], [CD] et [DA].

Où doit-on placer un point O tel que les quadrilatères OIAL, OJBI, OKCJ et OLDK aient la même aire ?

Exercice 4

Prouver que parmi cinq nombres réels positifs donnés on peut trouver deux réels a et b tels que

$$0 \leq \frac{a}{1+a^2} - \frac{b}{1+b^2} \leq \frac{1}{8}$$