

## ∞ Concours Fesic –Puissance Alpha 27 avril 2019 ∞

**Durée : 2 h**

*Durée de l'épreuve :*

*Présentation et méthodologie de l'épreuve de Mathématiques*

- 2h.
- 16 exercices proposés 12 exercices à traiter au choix.
- Chaque exercice comporte 4 propositions. Chaque exercice est indépendant des autres exercices proposés.
- Les exercices proposés se présentent sous la forme de QCM de type Vrai ou Faux.

### **Présentation**

*Cette épreuve a pour but d'évaluer votre capacité à analyser un problème donné, et à sélectionner les outils calculatoires et ou graphiques adéquats pour le résoudre. La connaissance de l'algèbre, de la géométrie et de l'analyse seront donc de mise pour aborder cette épreuve.*

### **Principe et objectifs de l'épreuve**

- *Cette épreuve a pour but d'évaluer l'étendue de vos connaissances dans le domaine des mathématiques, et votre capacité à mener des études analytiques, algébriques et géométriques.*
- *Les 16 exercices proposés couvrent l'ensemble du programme de Terminale S, de façon à ce que chaque élève puisse sélectionner des exercices dont le programme a déjà été abordé au sein de son lycée.*

### **Évaluation de l'épreuve**


- *L'évaluation est basée sur un bonus/malus : une bonne réponse rapporte 1 point, une mauvaise réponse retire 0,5 point, et l'absence de réponse équivaut à 0 point.*
- *Pour un même exercice, si les 4 réponses de l'élève sont correctes, alors il sera attribué automatiquement 1 point supplémentaire.*

**EXERCICE 1****Un peu de lecture graphique**

Dans le repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ , on donne les points  $A(2; 4)$ ,  $B(0; 1)$ ,  $C(3; 10)$ ,  $D(0; 8)$ .

On considère la fonction  $f$  définie et dérivable sur  $\mathbb{R}$  représentée par la courbe  $\mathcal{C}$  et  $F$  une primitive de  $f$  représentée par la courbe en pointillée  $(\Gamma)$ .

$A$  est un point de la courbe  $\mathcal{C}$ ,  $B$  et  $C$  sont deux points de la courbe  $(\Gamma)$ . La droite  $(AD)$  représente la tangente à  $\mathcal{C}$  au point  $A$ .



- La fonction  $f'$  est positive sur l'intervalle  $[0; 3]$ .
- $f'(2) = -3$ .
- Le coefficient directeur de la tangente à  $(\Gamma)$  au point d'abscisse  $x = 2$  est égal à 4.
- $\int_0^3 f(x) dx = 9$ .

**EXERCICE 2****Quelques questions de logique**

Soit  $a$  et  $b$  deux nombres réels tels que  $a < b$  et  $f, g, h$  trois fonctions définies sur un même intervalle  $I = [a; b]$ .

- Si, pour tout nombre réel  $x$  de l'intervalle  $I$ ,  $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$  et si les fonctions  $f$  et  $h$  admettent toutes les deux une limite finie lorsque  $x$  tend vers  $a$ , alors la fonction  $g$  admet elle aussi une limite finie lorsque  $x$  tend vers  $a$ .
- Si, pour tout nombre réel  $x$  de l'intervalle  $I$ ,  $f(x) < g(x)$  et s'il existe deux nombres réels  $L$  et  $L'$  tels que  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$  et  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L'$  alors  $L \leq L'$ .
- Si la fonction  $f$  est continue en  $x = a$ , alors la fonction  $f$  est dérivable en  $x = a$ .

d) La réciproque du c) est fausse.

**EXERCICE 3**

**Un peu de géométrie avec le nombre d'or :**

Soit  $a$  un nombre réel strictement positif. Dans le repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ , on pose B le point de coordonnées  $(a; 0)$ , C le point de coordonnées  $(a; a)$  et I le milieu du segment [OB].


On construit le quatrième sommet D du carré OBCD, M le point de la demi-droite [OB) tel que  $IM=IC$  et N le quatrième sommet du rectangle OMND.

On pose  $\Phi$  l'abscisse du point M.

On appelle **nombre d'or**  $\varphi$ , l'unique solution positive de l'équation du second degré  $x^2 - x - 1 = 0$ .

Un **rectangle est dit d'or** si le rapport entre la longueur  $L$  et la largeur  $l$  est égal au nombre d'or c'est-à-dire si  $\frac{L}{l} = \varphi$ .

- a) Si  $a = 1$ , alors  $\Phi = \varphi$
- b) Si  $a = 1$ , alors  $\Phi = 1 - \frac{1}{\varphi}$
- c) OMND est un rectangle d'or
- d)  $\cos(\widehat{BIC}) = \frac{\sqrt{5} + 1}{4}$



**EXERCICE 4**

**Un peu de lecture graphique**

Soit  $f$  la fonction définie par  $f(x) = x^2 - 2$  de courbe représentative  $(\mathcal{C}_f)$  et  $b_0$  le nombre réel 3.


On définit, pour tout entier naturel  $n$ , la suite  $(v_n)$  par  $v_{n+1} = \frac{v_n^2 + 2}{2v_n}$  et  $v_0 = b_0 = 3$ .

On pose  $B_0$  le point de coordonnées  $(b_0; 0)$  et  $A_0$  le point de  $(\mathcal{C}_f)$  d'abscisse  $b_0$ .

La tangente à  $(\mathcal{C}_f)$  au point  $A_0$  coupe l'axe des abscisses au point  $B_1$  de coordonnées  $(b_1; 0)$ .

$A_1$ , est le point de  $(\mathcal{C}_f)$  d'abscisse  $b_1$ , et  $B_2$  le point d'intersection de la tangente à  $(\mathcal{C}_f)$  au point  $A_1$ , avec l'axe des abscisses.

On recommence le même raisonnement et on pose, pour tout entier naturel  $n$ ,  $b_n$  l'abscisse du point  $B_n$ .



- a) Pour tout nombre réel  $\alpha$ , la tangente à la courbe  $(\mathcal{C}_f)$  au point d'abscisse  $\alpha$ , a pour équation  $y = 2\alpha x + \alpha^2 - 2$ .
- b)  $b_1 = \frac{11}{6}$ .
- c) Pour tout entier naturel  $n$ ,  $b_{n+1} = b_n^2 - 2$ .
- d) Soit  $N$  un entier naturel non nul. Les algorithmes suivants permettent de calculer le  $N$ -ième terme de la suite  $(v_n)$ .


Variables	$K$ est un nombre entier $V$ est un nombre réel $N$ est un nombre entier
Initialisation	$V \leftarrow 3$
Traitement	Lire $N$ Pour $K$ variant de 2 à $N + 1$ Début du Pour $V \leftarrow \frac{V^2 + 2}{2V}$ Fin du Pour
Sortie	Afficher $V$

Variables	$K$ est un nombre entier $V$ est un nombre réel $N$ est un nombre entier
Initialisation	$V \leftarrow 3$ $K \leftarrow 1$
Traitement	Lire $N$ Tant que $K < N + 1$ faire Début du Tant que $V \leftarrow \frac{V^2 + 2}{2V}$ $K \leftarrow K + 1$ Fin du Tant que
Sortie	Afficher $V$

**EXERCICE 5**  
**Probabilités conditionnelles**

À l'exercice de probabilité du concours Puissance Alpha de l'année dernière, 4 affirmations a), b), c) et d) étaient proposées. La probabilité que l'élève réponde correctement à la première affirmation était de 0,8. Si l'élève répondait correctement à une affirmation il avait 9 chances sur 10 de répondre correctement à la suivante. En revanche, si l'élève se trompait sur une affirmation, il avait 7 chances sur 10 de continuer de se tromper.

$i$  est un entier naturel compris entre 1 et 4 et  $C_i$  est l'évènement « l'élève répond correctement à l'affirmation n°  $i$  ».



- a) La probabilité de répondre correctement aux 4 affirmations est égale à  $p = 0,8 \times 0,9^4$ .
- b) La probabilité de répondre correctement à l'affirmation b) est égale à  $p' = 0,78$ .
- c) La probabilité de répondre correctement à l'affirmation a) sachant qu'on a répondu correctement à l'affirmation b) est égale à  $p'' = 0,9$ .
- d) La probabilité de répondre correctement aux affirmations b), c) et d) est égale à  $0,9^3$ .

**EXERCICE 6****Calculs d'intégrales**

- a)  $\int_1^e \frac{1}{x} \ln(x) dx = \frac{1}{2}$ .
- b)  $\int_0^1 \frac{3x}{\sqrt{x^2+1}} dx = \frac{3\sqrt{2}-3}{2}$ .
- c)  $\int_0^4 \frac{2}{\sqrt{x}} e^{\sqrt{x}} = 4(e^2 - 1)$ .
- d)  $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{\cos^2(x)} dx = \sqrt{3} - 1$ .

**EXERCICE 7****Calculs de limites**

- a)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{2x^2 - x + 1} - x = 0$ .
- b)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - 3e^x + 1}{2x + 5} = \frac{1}{2}$ .

Soit  $(u_n)$  la suite définie par  $u_0 = 1$  et, pour tout entier naturel  $n$ ,  $u_{n+1} = \frac{3}{4}u_n$ .  
 Pour tout entier naturel  $n$ , on définit la suite  $(S_n)$  par  $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$ .

- c) La suite  $(u_n)$  diverge.
- d)  $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = +\infty$ .

**EXERCICE 8****Petite étude de fonction exponentielle**

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = e^{\frac{x-1}{x^2}}$  de courbe représentative  $(\mathcal{C}_f)$  et  $\Delta$  la droite d'équation  $y = 1$ .

- a) Pour tout nombre réel  $x$  appartenant à  $\mathbb{R}$ ,  $f'(x) = \left(\frac{2-x}{x^3}\right) e^{\frac{x-1}{x^2}}$ .
- b)  $(\mathcal{C}_f)$  admet la droite  $\Delta$  comme asymptote horizontale en  $+\infty$  et en  $-\infty$ .
- c)  $(\mathcal{C}_f)$  admet l'axe des ordonnées comme asymptote verticale.
- d) L'équation  $f(x) = 0$  admet deux solutions sur  $\mathbb{R}$ .

**EXERCICE 9****Petite étude de fonction ln**

Soit  $f$  la fonction définie sur  $I = ]1; +\infty[$  par  $f(x) = \frac{\ln(x+1)}{\ln(x)}$  de courbe représentative  $(\mathcal{C}_f)$ .

- a) Pour tout nombre réel  $x$  de l'intervalle  $I$ ,  $f(x) = \ln\left(\frac{x+1}{x}\right)$ .
- b) Pour tout nombre réel  $x$ , de l'intervalle  $I$ , on a  $f'(x) = \frac{x \ln\left(\frac{x}{x+1}\right) - \ln(x+1)}{x(x+1)(\ln(x))^2}$ .
- c) La fonction  $f$  est strictement croissante sur  $I$ .
- d)  $(\mathcal{C}_f)$  admet la droite  $\Delta$  d'équation  $y = 0$  comme asymptote horizontale en  $+\infty$ .

**EXERCICE 10****Petite étude de suite**

Soit  $f$  la fonction définie sur  $I = ]0; +\infty[$  par  $f(x) = \frac{x^2 - 1}{4} - 2\ln(x)$  et  $\Phi$  la fonction définie sur  $J = \left[e^{-\frac{1}{8}}; +\infty\right[$  par  $\Phi(x) = \sqrt{1 + 8\ln(x)}$ .  
On pose  $(u_n)$  la suite définie par  $u_0 = 3$  et  $u_{n+1} = \Phi(u_n)$ .  
On rappelle, dans toute la suite de l'exercice, que  $\ln(2) \approx 0,7$ ,  $\ln(3) \approx 1,1$  et  $\ln(4) \approx 1,4$ .

- a)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ .
- b) L'équation  $f(x) = 0$  admet deux solutions dont l'une  $x_0$  appartient à l'intervalle  $[3; 4]$ .
- c)  $x_0 = \Phi(x_0)$ .
- d) Pour tout entier naturel  $n$ , on a  $u_n \geq 3$ .

**EXERCICE 11****Notions de base sur les nombres complexes**

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ .

- a)  $(-\sqrt{3} + i)^3 = 8i$ .
- b) La forme exponentielle de  $-\sqrt{3} - i$  est  $-2e^{i\frac{\pi}{6}}$ .

Soit  $f$  la transformation complexe du plan qui, à tout point  $M$  d'affixe  $z \neq 3i$  associe le point  $M'$  d'affixe  $z' = \frac{\bar{z} + i}{\bar{z} + 3i}$ .

- c) L'équation  $|z'| = 1$  admet une unique solution dans  $\mathbb{C}$ .
- d) L'équation  $z' = 2$  admet une unique solution dans  $\mathbb{C}$ .

**EXERCICE 12****Utilisation des nombres complexes en géométrie**

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ .

A, B, C et D sont les points du plan complexe d'affixes respectives  $z_A = i\sqrt{3}$ ,  $z_B = -i\sqrt{3}$ ,  $z_C = 3 + 2i\sqrt{3}$  et  $z_D = \bar{z}_C$ .


Le point E, d'affixe  $z_E$  est le symétrique du point D par rapport au point O.

- a)  $z_E = -3 - 2i\sqrt{3}$ .
- b) L'ensemble des points  $M$  du plan complexe tels que  $|z| = z$  est une droite.
- c) Les points A, B, C et D sont sur un même cercle de centre  $\Omega$  d'affixe 3.
- d)  $(\vec{BC}, \vec{BE}) = \frac{\pi}{3} \pmod{2\pi}$ .

**EXERCICE 13**

**Section dans un cube**

ABCDIJKL est un cube de côté 1 et  $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AI})$  est un repère orthonormé de l'espace. On pose G le centre de gravité du triangle BIK.



- a) Le point G a pour coordonnées  $(-\frac{2}{3}; \frac{1}{3}; \frac{2}{3})$ .
- b) Les points J, G et D sont alignés.
- c) La droite (JD) et le plan (BIK) sont perpendiculaires.
- d) Le volume du tétraèdre IKBJ est égal a  $\frac{1}{6}$ .

**EXERCICE 14**

**Petit tour d'horizon sur les probabilités continues**

Soit  $\lambda$  un nombre réel strictement positif. On pose :


- $\alpha$  et  $\beta$  deux nombres réels tels que  $0 < \alpha \leq \beta < 1$
- $U$  la variable aléatoire suivant la loi uniforme sur l'intervalle  $[0;1]$
- $X$  la variable aléatoire définie par la relation  $X = -\frac{1}{\lambda} \ln(1 - U)$ .

- a) Pour tout nombre réel  $a \in ]0; 1[$ ,  $P(U = a) > 0$ .
- b) Pour tout nombre réel  $a$  strictement positif,  $p(X < a) = p(U \leq 1 - e^{-\lambda a})$ .
- c)  $P(U \leq \beta) = \beta$ .
- d)  $P(\alpha \leq X \leq \beta) = e^{-\lambda\beta} - e^{-\lambda\alpha}$ .

**EXERCICE 15**

**Petite suite de points**

Soit  $n$  un entier naturel non nul et  $(M_n)$  la suite de points de coordonnées  $(n; 0)$ . Pour tout entier naturel  $n$  non nul, on pose  $\mathcal{A}_n$ , l'aire de la partie du plan comprise entre les demi-cercles de diamètres  $[OM_n]$  et  $[OM_{n+1}]$  et l'axe des abscisses (cf. figure ci-contre).




- a)  $A_1 = 3\pi$  et  $A_2 = 5\pi$ .  
 b)  $A_n = 2 \times \pi \times n + \pi$ .  
 c) La suite  $(A_n)_{n \geq 1}$  est une suite arithmétique de raison  $r = 2\pi$ .  
 d) Pour tout entier naturel  $n$  non nul,  $S_n = A_1 + A_2 + \dots + A_n = \frac{\pi}{8} \times n \times (n+2)$ .

**EXERCICE 16****Travail autour d'un cuboctaèdre**

ABCDEFGH est un cube de côté 1 et  $(A; \vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AE})$  est un repère orthonormé de l'espace.

**Définition**

On appelle **cuboctaèdre** le solide ayant pour sommets les milieux des arêtes d'un cube.



Dans le cube ABCDEFGH, on définit I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S et T les milieux respectifs des arêtes [AB], [BF], [EF], [AE], [FG], [CG], [BC], [EH], [AD], [HG], [BD] et [CD].

On appelle  $(\Gamma)$  le cubocatèdre ainsi obtenu (cf. figure ci-dessus).

$\Delta$  est la droite dont une représentation paramétrique est 
$$\begin{cases} x = 0,5 \\ y = 0,25 - 0,13t \\ z = 1,25 - 0,13t \end{cases} \text{ avec } t \in \mathbb{R}.$$

- a) Le cuboctaèdre  $(\Gamma)$  se compose de 6 faces carrées, huit faces triangulaires et a un volume  $V = \frac{5}{6}$ .  
 b) Les plans (SQT) et (KMJ) sont sécants.  
 c) Les plans (JKM) et (LKP) sont sécants suivant une droite parallèle à la droite (IR).  
 d) Les plans (JKM) et (LKP) sont sécants suivant la droite  $\Delta$ .




# STAGES PRÉPA CONCOURS PUISSANCE ALPHA

## LA MEILLEURE PRÉPA PUISSANCE ALPHA

- Un suivi authentique et très humain
- Préparation aux oraux
- S'entraîner aux épreuves en conditions réelles
- Une équipe pédagogique de haut niveau



 [Préparation concours  
Puissance Alpha](#)

## STAGES PRÉPA CONCOURS PUISSANCE ALPHA EN LIGNE

- Abordez avec sérénité les concours
- Une équipe dédiée à l'écoute de chacun,
- Des méthodes et stratégies exclusives pour les étudiants



 [Stage en ligne prépa  
concours Puissance Alpha](#)